

neo630 IPRO

Grupo de maturação

6.5

Peso de mil grãos

162g

Potencial de ramificação

médio

Exigência à fertilidade

Média 2 Alta


Alto potencial
produtivo nas regiões
mais quentes

Ampla região de
adaptação

Resistência à
Podridão Radicular de
Phytophthora raça 1

■ Preferencial ■ Tolerada

Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.



Recomendações

		micro	ciclo médio (dias)	set	out	nov	dez	densidade de plantas (mil plantas/ha)
				10 15 20 25 01 05 10	15 20 25 01 05 10	15 20 25 01 05 10	01 05 10 15	
MS	Arenito	202	110	■				220-340
	Sul (sequeiro)	206	110	■				220-340
	Oeste	207	110	■				220-340
	Oeste (abaixo de 500m)	201	122	■	■			220-320
	Oeste (acima de 500m)	201	131	■	■			220-300
PR	Arenito	202	110	■				220-340
	Centro (abaixo de 600m)	203	114	■	■			220-320
	Centro (acima de 600m)	203	122	■	■			220-300
	Norte (abaixo de 600m)	203	114	■	■			220-320
	Norte (acima de 600m)	203	122	■	■			220-300
SP	Arenito	202	110	■				240-340
	Sudoeste (abaixo de 600m)	203	114	■	■			220-320
	Sudoeste (acima de 600m)	203	122	■	■			220-300
	Centro	204	114	■				240-340
Oeste	205	114	■				240-340	