

# neo661 I2X

INTACTA<sup>2</sup>  
XTEND

Lançamento

Grupo de maturação

**6.6**

Peso de mil grãos

**171g**

Potencial de ramificação

**alto**

Exigência à fertilidade


Média **3** Alta

Alto potencial  
produtivo

Excelente adaptação  
às regiões de menor  
altitude

Ampla região de  
adaptação

Resistência à  
Podridão Radicular de  
Phytophthora raça 1



## Recomendações

	micro	ciclo médio (dias)	set			out			nov			dez			densidade de plantas (mil plantas/ha)	
			10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05		10
<b>MS</b>	Arenito	202	113	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
	Sul (sequeiro)	206	113	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
	Oeste	207	113	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
<b>PR</b>	Oeste (abaixo de 500m)	201	126	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
	Oeste (acima de 500m)	201	135	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-280
	Arenito	202	113	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
	Centro (abaixo de 600m)	203	117	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
	Centro (acima de 600m)	203	126	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-300
	Norte (abaixo de 600m)	203	117	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
<b>SP</b>	Norte (acima de 600m)	203	126	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-300
	Arenito	202	113	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												220-320
	Sudoeste (abaixo de 600m)	203	117	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-320
	Sudoeste (acima de 600m)	203	126	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												200-300
	Oeste	205	117	[Bar chart showing planting windows from Sep to Dec]												220-320

■ Preferencial ■ Tolerada

Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.